

今日の元気、明日の活力！

天然素材100%使用の  
植物活力剤

沖縄県産月桃使用


# Sa-ga

サ - ガ

野菜類・果樹類・花き類にもっと **POWER** を！



沖縄県産月桃に秘められた  
パワーを抽出した  
画期的(プライミング効果)  
『植物活力剤』



※多くの野菜類・果樹類・花き類  
に使用できます。

## 天然素材100%使用の植物活力剤



沖縄県産  
『月桃精油』  
『月桃抽出エキス』  
配合

### ◆ 使用方法

- ・展着剤は脂肪酸エステル系・植物コーティング剤をお薦めします。
- ・基本的には定植活着後生育開始時のタイミングで1回目を、3~4日後に2回目を散布してください。
- ・土壌にも意識的に散布してください。定植前の苗にもご使用いただけます。
- ・倍率は、野菜類・果樹類・施設作物・花き類には 3,000~5,000倍 に薄めてご使用ください。  
※高温期・厳寒期は活性が落ちる可能性がありますので、濃度を調整してください。  
※施設作物で節間が短くなる可能性がありますので、濃度を調整してください。  
※露地作物で収穫時期が早くなることもあります。
- ・病害虫が既に発生している場合は、薬剤散布後、数日おいてからご使用ください。
- ・台風等により塩害風害等を受けた場合は、葉や茎を本製品でよく洗い流してください。
- ・生殖生長時よりアミノ酸入り液肥等加用をお薦めします。肥料分析値を参照してください。
- ・本製品の散布間隔は気温、降水量、紫外線等を考慮して調整してください。
- ・成虫が作物に寄り定着し始めたら、3回目以降の散布目安としてください。

### ◆ 使用上の注意

- ・本製品は農薬ではありません。
- ・本製品は薄めてご使用ください。希釈倍率を順守してご使用ください。
- ・高濃度により、作物が異常な生育をする場合があります。
- ・使用前は必ずよく振ってください。本剤と水をしっかり攪拌してから散布してください。
- ・希釈した液は散布当日に使い切ってください。
- ・初めて使用する場合は必ず小面積で確認してください。
- ・本製品は約-20℃で凍結しますが、解凍してご使用いただけます。
- ・天然素材100%で製造しております。着色料、酸化防止剤等は一切使用しておりませんので、色の変化、沈殿物が現れます。高温を避け暗所で保管してください。
- ・蜂・アブラムシ・ゾウムシ・バッタ類については影響ありません。

品 名：Sa-ga(植物活力剤) 内 容 量：1000ml

原 材 料：月桃抽出エキス、月桃精油、植物抽出エキス、水、エタノール(サトウキビ発酵アルコール)

肥料分析：PH:6.6 EC:0.54 N:0.05 P:0.01 K:0.03

— 特許出願中 —

月桃精油・月桃茎葉抽出エキス使用商品の病虫害・動物・

鳥類に対する影響事例

※事例であり、確実に影響を与えることを保証しているものではありません。  
気候条件・使用時期・環境により差異があります。

※実際確認した事例・利用者からの報告事例等から作成しました。

20190410 現在

区 分	事 例
動 物	モグラ・ネズミ・イタチ                      アライグマ・猿（青森県） ヘビ（確認していないが忌避すると言われている）
鳥 類	ヒヨドリ（野菜畑）・スズメ（イネ） ※月桃チップを吊るす方法もあります。
害 虫（成虫が主） 特に触角・触肢を持つ ている成虫を忌避し ています。 （ダニは触肢＝触角）	ナメクジ・モンシロチョウ・ハスモンヨトウ・スリップス コナジラミ類・キスジノミハムシ・コナガ・ナガメ・ダニ セアカゴケダニ・テントウムシダマシ（オオニジュウヤホシ テントウムシ）アワノメイガ・ハモグリバエ・カメムシ類（種 類多いため影響しない場合もあり）・蚊・オオタバコガ
病 気 カビ類・糸状菌・細菌	うどんこ病・黒腐れ病・べと病・葉カビ病・黒スス病 黒斑細菌病・灰色かび病・葉カビ病・バラ黒点病（品種差有） 黒星病（リンゴ・確認中）
影響しない虫類・小動 物	ハチ・アブラムシ・ゾウムシ類    ・バッタ類・カタツムリ ハナバエ・ハナアブ・タヌキ